Signes avant-coureurs de l'AVC

Un AVC peut être traité – c'est pourquoi il est si crucial d'en reconnaître les signes avant-coureurs :

Si vous les remarquez, réagissez **immédiatement** en composant le **9-1-1** ou votre numéro d'urgence local. Vous pouvez ainsi améliorer considérablement la chance de survie et de rétablissement.

Imprimez les signes avant-coureurs de l'AVC et placez-les sur votre réfrigérateur ou dans votre portefeuille.

Faiblesse - Perte soudaine de force ou engourdissement soudain au visage, à un bras ou à une jambe, même temporaire.

Trouble de la parole - Difficulté soudaine d'élocution, de compréhension ou confusion soudaine, même temporaire.



Trouble de vision - Problème de vision soudain, même temporaire.

Mal de tête - Mal de tête soudain, intense et inhabituel.

Étourdissement - Perte soudaine de l'équilibre, en particulier si elle s'accompagne d'un des autres signes.

Si ces symptômes se manifestent, composez le **9-1-1** ou votre numéro d'urgence local immédiatement.

La présente liste ne comporte que des signes avant-coureurs généraux d'un AVC, et non pas tous les signes possibles. Certaines personnes pourraient ressentir des signes avant-coureurs ne figurant pas dans cette liste.

© Reproduit avec l'autorisation de la Fondation des maladies du cœur du Canada, 2011.